

## **PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO FIBRO EDEMA GELÓIDE EM UM GRUPO DE MULHERES UNIVERSITÁRIAS**

**Carolina Pontes Silva<sup>1</sup>; Vanessa Costa <sup>2</sup>;Ana Paula Martins<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Graduandas do curso de Fisioterapia – UNIVIÇOSA, Viçosa-MG;  
E-mail: anapaulamartins53@bol.com.br

<sup>2</sup> Professora do curso de Fisioterapia – UNIVIÇOSA, Viçosa-MG.

### **Resumo:**

O Fibro Edema Gelóide (FEG) conceitua-se clinicamente como espessamento não inflamatório das capas subepidérmicas. Diversas hipóteses foram criadas para designar a sua etiologia. O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência dos fatores predisponentes para o aparecimento da FEG em universitárias regularmente matriculadas na Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde (UNIVIÇOSA). Para coleta dos dados utilizamos a seção de anamnese do PAFEG (protocolo de avaliação do fibro edema gelóide). Os itens pesquisados incluíram: idade, estresse emocional, tabagismo, etilismo, alimentação, sedentarismo, uso de medicação (corticóides, esteróides e uso de anticoncepcionais), histórico familiar, período de aparecimento e localização do FEG. Após análise dos dados, mostraram-se altamente prevalentes nas participantes do estudo os seguintes fatores de risco: histórico familiar de FEG, estresse emocional e sedentarismo. Quanto à localização do FEG, a maior prevalência deu-se na região glútea.

**Palavras-chave:** Fibro Edema Gelóide, Dermato-Funcional, Prevalência